

FÖRVARING

- Aranesp® förvaras vid 2 °C till 8 °C (i kylskåp) och får inte frysas.
- Aranesp® är ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen.
- När en injektionspennas har tagits ut ur kylskåpet och antagit rumstemperatur (högst 25 °C) måste den användas inom 7 dagar.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Efter användning skall injektionspennan kasseras enligt anvisning från apotek eller sjukvårdspersonal.

BIVERKNINGAR

Biverkningar av Aranesp® som högt blodtryck, smärta vid injektionsstället och överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Dessa biverkningar är vanligtvis övergående men om något av symtomen kvarstår ska du tala om det för din läkare eller sjuksköterska.

Aranesp® (darbepoetin alfa) R_{xs} (F) injektionsvätska, lösning
förfylld spruta 10 – 500 µg samt injektionspennor 20, 40, 60, 80, 100, 150, 300 samt 500 µg. ATC kod: B03XA02.

Indikationer: Behandling av symptomgivande anemi hos vuxna och barn med kronisk njursvikt (CRF). Behandling av symptomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi.

Kontraindikation: Använd inte Aranesp® vid otillräckligt kontrollerad hypertoni (högt blodtryck). Biverkningar av Aranesp® som högt blodtryck, smärta vid injektionsstället och överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

För mer information läs alltid bipacksedeln som medföljer förpackningen alternativt online på FASS allmänhet (www.fass.se) Datum för översyn av bipacksedel: februari 2021. www.amgen.se

SWE-291-0223-80001 Feb 2023



Aranesp®
(darbepoetin alfa)

Patientinformation
Injektionspenna (SureClick)
får endast distribueras via vårdpersonal

AMGEN®

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna,
08 - 695 11 00, www.amgen.se



VAD ÄR ANEMI?

Doktorn säger anemi och på vardagssvenska kallas det blodbrist.

Två ord för samma sak, nämligen brist på röda blodkroppar. I den röda blodkroppen finns det röda färgämnet hemoglobin. Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg och som transporterar syre till kroppens vävnader. Om blodet har för låg halt hemoglobin minskar förmågan att transportera syre till t ex muskler och hjärnan. Symtomen som därvid uppträder är trötthet, sänkt koncentration förmåga och muskelsvaghet.

Njuren deltar aktivt i bildningen av röda blodkroppar genom att producera ett hormon som kallas erytropoietin. Vid avancerad njursjukdom uppstår brist på detta hormon. Detta är den viktigaste orsaken till att njursvikt ger upphov till anemi. Anemi konstateras genom ett vanligt blodprov som kontrollerar hemoglobinhalten (Hb-värdet) i blodet.

DIN LÄKARE HAR ORDINERAT ARANESP® FÖR BEHANDLING AV ANEMI

Aranesp® verkar på samma sätt som det naturliga hormonet erytropoietin och tas vanligtvis 1-4 gånger per månad.

Vid behandling med Aranesp® kan det ta upp till 4 veckor innan Hb-värdet stiger och du känner dig piggare.

FÖRBEREDELSE FÖR INJEKTION

Ta ut injektionspennan ur kylskåpet. Låt den ligga framme ca 30 minuter då injektionen känns behagligare om injektionsvätskan är rumstempererad.

OBS! Skaka inte den förfyllda injektionspennan. Tvätta händerna!

Kontrollera utgångsdatum och se efter så att injektionsvätskan är klar och färglös eller svagt pärlemorskimrande (om den är grumlig eller innehåller partiklar ska den inte användas).




SÅ HÄR ANVÄNDER DU SURECLICK

ARANESP® FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA - LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING

1. Välj injektionsställe. Lämpliga injektionsställen är:


- Utsidan av överarmen (endast om någon annan ger injektionen)
- Buken (förutom i en cirkel om 5 cm närmast naveln)
- Framsidan av låret (rekommenderas)




2. Dra av den grå skyddshylsan först när du är redo att injicera.

Håll injektionspennan ovanför inspektionsfönstret med ena handen och dra skyddshylsan rakt ut med den andra handen.


Kassera skyddshylsan.



3. Sträck ut eller nyp ihop huden runt injektionsstället för att få en spänd yta.






eller




Viktigt: Det är viktigt att fortsätta sträcka ut eller nypa ihop huden under hela injektionen.

4. Placera injektionspennan vinkelrätt (90°) mot huden. Den röda startknappen skall vara riktad uppåt och skyddshylsan skall vara av. Tryck bestämt injektionspennan mot huden tills det tar stopp. Håll kvar.



Gult säkerhetsskydd
tillbakadraget

5. Börja injicera. När du är redo att injicera tryck ner den röda startknappen. Du kommer att höra ett första klick.




6. Fortsätt trycka ner injektionspennan mot huden tills det hörs ett andra klick. Injektionen tar ca 15 sekunder.



7. Efter injektionen. Kontrollera att inspektionsfönstret har blivit gult. Lyft bort injektionspennan. Nålen täcks automatiskt. Kassera pennan i särskilt avsedd behållare.

15 sekunder



Fönstret blir gult
när injektionen är klar